

Contralac[®]

TER ONDERBREKING VAN DE LACTATIE EN SCHIJNDRACHTSYMPTOMEN BIJ TEVEN EN POEZEN

■ SAMENSTELLING

CONTRALAC[®] 5

Bevat per tablet :

Metergoline.....0,5 mg

Excipiens.....tot 55 mg

CONTRALAC[®] 20

Bevat per tablet :

Metergoline..... 2 mg

Excipiens..... tot 220 mg

■ EIGENSCHAPPEN

Prolactine is het hormoon dat verantwoordelijk is voor de melkproductie en wordt uitgescheiden door de hypofyse. De secretie wordt gereguleerd door 2 neurosecreten, nl :

Prolactine Inhibiting Factor : vnl. dopamine, remt de afscheiding van prolactine.

Prolactine Releasing Factor : vnl. serotonine, bevordert de uitscheiding van prolactine.

Metergoline in CONTRALAC[®] bezit een snelle en sterke anti-serotonine werking. De remming van de afscheiding van prolactine resulteert binnen enkele dagen in het afnemen van de gebruikelijke symptomen, die ontstaan bij schijnvrucht of ongewenste post-partum lactatie, zoals gedragsveranderingen, zwelling van de melkklieren en afscheiding van sereus vocht of melk uit de melkklieren. Indien toegepast in de aangegeven dosering oefent metergoline, in tegenstelling tot andere prolactine-remmende stoffen, geen dopamine werking uit. Hierdoor wordt braken als bijwerking zeer zelden waargenomen.

■ INDICATIES

Teven en poezen :

- onderbreking van de lactatie en andere symptomen bij schijnzwangerschap.
- onderbreking van post-partum lactatie.

■ BIJWERKINGEN

Mogelijkheid van :

- lichte vorm van diarree
- excitatie en agitatie
- braken aan het begin van de behandeling

■ TOEDIENINGSWIJZE / DOSERING

Teven.

Gedurende 4 dagen :

CONTRALAC® 5 : tweemaal per dag 0,1 mg metergoline/kg lich.gew.,
hetgeen overeenkomt met 's morgens en 's avonds
1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht.

CONTRALAC® 20 : 's morgens en 's avonds 1 tablet per 20 kg lich.gew.

Indien de symptomen niet volledig zijn verdwenen, de behandeling 4 dagen voortzetten.

Poezen.

Gedurende 4 dagen :

CONTRALAC® 5 : tweemaal per dag 0,125 mg metergoline/kg lich.gew.,
hetgeen overeenkomt met 's morgens en 's avonds
1 tablet per 4 kg lichaamsgewicht.

Indien de symptomen niet volledig zijn verdwenen, de behandeling 4 dagen voortzetten.

■ BEWARING / HOUDBAARHEID

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en donker bewaren.

■ VERPAKKING

Doosjes met 16 tabletten in doordrukstrip.

CONTRALAC® 5

REG NL 2274

CONTRALAC® 20

REG NL 2272

TEVEN

	CONTRALAC® 5		CONTRALAC® 20	
	'S MORGENS	'S AVONDS	'S MORGENS	'S AVONDS
5 kg	●	●		
10 kg			☾	☾
15 kg			☾	☾
20 kg			●	●
40 kg			●●	●●

POEZEN

	CONTRALAC® 5	
	'S MORGENS	'S AVONDS
2 kg	☾	☾
4 kg	●	●
6 kg	●●	●●

Diergeneesmiddel U.D.A.

Importeur : Virbac Nederland BV • Barneveld

Fabrikant : Virbac Laboratories • 06516 Carros • France