

Borgal® 24%

OPLOSSING VOOR INJECTIE

■ FABRIKANT EN VERGUNNINGHOUDER

VIRBAC, 1ere Avenue 2065 M-LID, F-06516 Carros. Frankrijk

■ WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Trimethoprim 40 mg
Sulfadoxine 200 mg

■ INDICATIES

Rund en kalf:

- respiratoire infecties veroorzaakt door *Pasteurella* spp., *Streptococcus* spp., *Haemophilus* spp., *Corynebacterium* spp., *Salmonella* spp. of *Fusobacterium necrophorum*;
- maag- en darminfecties veroorzaakt door *Escherichia coli* of *Salmonella* spp.;
- peritonitis veroorzaakt door *E. coli*, *Corynebacterium pyogenes* of anaëroben;
- urogenitale infecties veroorzaakt door *Streptococcus* spp., *E. coli*, *Corynebacterium pyogenes* of *Salmonella* spp.;
- huidinfecties veroorzaakt door *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Actinomyces* spp. of *Actinobacillus* spp.;
- mastitis veroorzaakt door *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *E. coli* of *Klebsiella* spp.;
- wondinfecties veroorzaakt door Gram-positieve of Gram-negatieve bacteriën;
- arthritis veroorzaakt door *E. coli*, *Salmonella* spp., *Corynebacterium pyogenes*, *Streptococcus* spp. of *Pasteurella* spp.;
- gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door *E. coli sepsis*, *Listeria monocytogenes*, *Haemophilus somnus*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp. of *Corynebacterium pyogenes*;
- (tussen)klauwinfecties veroorzaakt door *Fusobacterium necrophorum*.

Varken:

- respiratoire infecties veroorzaakt door *Pasteurella multocida*, *Streptococcus* spp., *Haemophilus* spp. of *Staphylococcus* spp.;
- maag- en darminfecties veroorzaakt door *Escherichia coli* of *Salmonella* spp.;
- peritonitis veroorzaakt door *E. coli*;
- urogenitale infecties veroorzaakt door *Streptococcus* spp., *E. coli*, *Corynebacterium suis* of *Erysipelothrix rhusiopathiae*;
- huidinfecties veroorzaakt door *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Fusobacterium necrophorum* of *Actinobacillus* spp.;
- mastitis veroorzaakt door *Streptococcus* spp. of *E. coli*;
- wondinfecties veroorzaakt door *Streptococcus* spp., *E. coli*, *Corynebacterium* spp. of anaëroben;
- arthritis veroorzaakt door *Streptococcus* spp., *Haemophilus parasuis*, *Corynebacterium pyogenes* of *Actinobacillus suis*;
- polyserositis veroorzaakt door *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp. of *Haemophilus parasuis*;
- gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door *E. coli sepsis*, *Listeria monocytogenes*, *Streptococcus* spp., *E. coli* of *Salmonella* spp.;
- (tussen) klauwinfecties veroorzaakt door *Fusobacterium necrophorum* of *Corynebacterium pyogenes*.

Paard en veulen:

- respiratoire infecties veroorzaakt door *Streptococcus* spp. of *Staphylococcus* spp.;
- maag- en darminfecties veroorzaakt door *Escherichia coli* of *Salmonella* spp.;
- peritonitis veroorzaakt door *E. coli*;
- urogenitale infecties veroorzaakt door *Streptococcus* spp. of *E. coli*;
- huidinfecties veroorzaakt door *Staphylococcus* spp.;
- wondinfecties veroorzaakt door *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., Gram-positieve of Gramnegatieve bacteriën;
- arthritis veroorzaakt door *E. coli* of *Salmonella* spp.;
- gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door *E. coli sepsis*, *Listeria monocytogenes*, *Streptococcus* spp., *E. coli*, *Pasteurella* spp. of *Salmonella* spp.

Kleine knaagdieren:

- primaire en secundaire infecties veroorzaakt door voor de combinatie trimethoprim sulfadoxine gevoelige bacteriën.

■ CONTRA-INDICATIES

Geen.

■ BIJWERKINGEN (FREQUENTIE EN ERNST)

- Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties en necrose worden waargenomen tengevolge van weefselirritatie.
- Anaemie, leukopenie en thrombocytopenie

■ DOELDIER

Rund, kalf, varken, paard, veulen en kleine knaagdieren.

■ DOSERING

Rund, kalf, paard, veulen en varken:

1 ml per 16 kg lichaamsgewicht (2,5 mg trimethoprim en 12,5 mg sulfadoxine per kg lichaamsgewicht) gedurende 3 dagen.

Kleine knaagdieren:

0,1 ml per kg lichaamsgewicht (4,0 mg trimethoprim en 20 mg sulfadoxine per kg lichaamsgewicht) per dag.

Toedieningsweg:

Rund, kalf, varken, paard en veulen: intraveneus of intramusculair;
Kleine knaagdieren: oraal via het drinkwater.

■ WACHTTERMIJN

Rund: slacht: 8 dagen ; melk: 3 dagen
Varken: slacht: 10 dagen
Paard: slacht: 10 dagen
Veulen: slacht: 10 dagen

■ BEWAREN

Niet in de koelkast bewaren, niet invriezen.
Aangeprikte flacon: 8 weken houdbaar.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

■ SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Er bestaat kans op het optreden van acute sterfte, haemolyse of shock na intraveneuze toediening. In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.
Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

■ VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

REG NL 5281 UDD

Juni 2009

Doos met 1 of 5 glazen flacons à 10, 50 of 100 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.